




Hypnose, bloc paravertébral et chirurgie du cancer du sein

Dr Arnaud BOUZINAC





Mastectomie sous hypnose

Jules Cloquet (1790-1883)

C. Virot et F. Bernard - Hypnose, douleurs aiguës et anesthésie

Hypnose et chirurgie du cancer du sein

- * Hypnosis decreases presurgical distress in excisional breast biopsy patients.


SCHNUR JB. Anesth Analg 2008

- * Breast cancer surgery under hypnosis and local anesthesia: feasibility and potential benefits.

ROELANTS F. EJA 2011

BPV échoguidé

- * Visualisation de la plèvre : gain de **sécurité**.
- * Contrôle de l'injection d'AL: gain de **fiabilité**.
- * Choix du niveau thoracique: gain de **précision**.



Protocole hypnose et BPV

- * BPV: ropivacaïne 0.375%. 15ml en T2-T3 et T4-T5.
- * Ultiva®: 0.025 μ g/kg/min en per-opératoire.
- * Orientation *ici et maintenant* dans la salle d'opération.
- * Signaling (bolus 20 μ g remifentanil).
- * Induction de la transe.
- * Accompagnement dans un souvenir agréable.
- * Suggestion(s) post-hypnotique(s).
- * Réassociation lors du pansement.

Limites et contre-indications

* Liées à la chirurgie:

- Chirurgie longue.
- Risque hémorragique.
- Position demi-assise.

* Liées à l'hypnose:

- Implication de l'équipe chirurgicale.
- Disponibilité de l'anesthésiste!

Quand proposer l'hypnose?

- * À la consultation d'anesthésie?
- * Lors de la visite pré-anesthésique?
- * En salle de pré-anesthésie?
- * Au bloc opératoire?



Hypnose, ALR, et analgésie

Quel intérêt dans la chirurgie du cancer du sein?




Douleurs aiguës après chirurgie du cancer du sein

- * L'anxiété pré-opératoire est un des principaux facteurs de risque de douleurs post-opératoires.

KATZ J. PAIN 2005


- * Le bloc para-vertébral est la technique la plus efficace pour l'analgésie post-opératoire.



SCHNABEL A. BJA 2010



BPV et douleurs chroniques



KAIRALUOMA P. Anesth Analg 2006



Hypnose, ALR, et douleurs chroniques


- * L'hypnose conversationnelle *per-opératoire* diminue l'incidence des douleurs chroniques après une chirurgie du canal carpien sous ALR.

BELZE O. AFAR 2012


Hypnose et BPV:

une association *synergique* pour l'analgésie des patientes opérées d'un cancer du sein ?





Cancer



Chirurgie



Anesthésie



Chirurgie

Hypnose

ALR





Hypnose, bloc paravertébral
et chirurgie du cancer du sein

Merci de votre attention !